

**2. Übung (Abgabe Di. 9. November 2010 zu Beginn der Vorlesung oder spätestens bis 16:00 im Briefkasten im Sekretariat bei Frau Badow)**

**5. Parabolisches Verhalten von  $E(k)$  an der Zonengrenze**

Am Rand der Brillouin-Zone entsteht aufgrund eines periodischen Potentials eine Energielücke  $E_g$ . Es sei dort das reelle Potential nur durch zwei Fourier-Koeffizienten gegeben:

$$U(x) = U_G e^{iGx} + U_{-G} e^{-iGx} = 2U \cos(Gx), \text{ mit } U_G = U_{-G} = U \text{ und } |U| \ll E(k = \pm \frac{1}{2}G),$$

wobei  $G$  ein reziproker Gittervektor und  $E(k)$  die Energie des Elektrons ist. Man nehme weiter an, dass in der Fourier-Darstellung der Bloch-Wellenfunktion des Elektrons,  $\Psi_k(x) = \sum_G C_{k-G} e^{i(k-G)x}$ , nur die beiden Glieder  $C_{\pm \frac{1}{2}G}$  beitragen, die restlichen Glieder seien zu vernachlässigen. Daraus folgt  $E_g = 2U$ . Zeigen Sie nun, dass sich die Energiefunktion  $E(k)$  am Rand der Brillouin-Zone parabolisch verhält, d.h. dass gilt:

$$E_{\pm}(\Delta k) = E_{\frac{1}{2}G \pm} + \frac{\hbar^2 \Delta k^2}{2m} \left( 1 \pm 2 \frac{\lambda}{U_G} \right), \text{ mit } E_{\frac{1}{2}G \pm} = \lambda \pm U_G, \quad \lambda = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{1}{2}G \right)^2 \text{ und}$$

$$\Delta k = k - \frac{1}{2}G \ll G.$$


*Hinweis: Siehe Online-Übungsblatt mit Hinweisen.*

(2 Punkte)

**6. Indirekte Übergänge**

Im reziproken Raum liegt das Leitungsbandminimum von Germanium [kubische Gitterkonstante  $a = 5.658 \text{ \AA}$ , Bandlücke  $E_g(80 \text{ K}) = 0.722 \text{ eV}$ ] genau am  $L$ -Punkt und das Valenzbandmaximum am  $\Gamma$ -Punkt. Ein indirekter optischer Übergang ist daher nur mit Hilfe von Phononen möglich. Bestimmen Sie für einen indirekten optischen Übergang vom Valenzbandmaximum in das Leitungsbandminimum anhand der Phononendispersionsrelation von Germanium (siehe Abbildung) die maximale Anzahl der möglichen Übergänge unter Vernachlässigung von Auswahlregeln (d.h. alle möglichen Übergänge sind erlaubt) sowie die dazugehörigen Laser-Wellenlängen.

**Dispersion für Germanium (80 K) in [111]-Richtung**



*Hinweis: Siehe Online-Übungsblatt mit Hinweisen.*

(2 Punkte)

**2. Übung (Abgabe Di. 9. November 2010 zu Beginn der Vorlesung oder spätestens bis 16:00 im Briefkasten im Sekretariat bei Frau Badow)**

**7. Herleitung der Bewegungsgleichung aus der Heisenberg-Darstellung**

Leiten Sie die Bewegungsgleichung für Bloch-Elektronen unter Einfluss einer äußeren, konstanten Kraft  $\vec{F}$  her:  $\vec{F} = \hbar d\vec{k}/dt$ . Benutzen Sie dazu die Heisenberg-Darstellung der Zeitableitung eines Operators  $A$ :  $dA/dt = (i/\hbar)[H, A]$ , mit  $H = H_0 - \vec{F} \cdot \vec{r}$ .  $H_0$  ist der translationsinvariante Hamilton-Operator des ungestörten Systems, d.h. es gilt  $[H_0, T] = 0$  mit dem Translationsoperator  $T$ :  $Tf(\vec{r}) = f(\vec{r} + \vec{T})$ , wobei  $\vec{T}$  ein Gittervektor ist und  $f$  eine beliebige Funktion.

- (a) Zeigen Sie, dass der Translationsoperator für Bloch-Wellen gegeben ist durch:  $T = e^{i\vec{k}\vec{T}}$ .
- (b) Leiten Sie nun die Bewegungsgleichung her, indem Sie in der Heisenberg-Darstellung den Operator  $A$  durch  $T$  ersetzen.

(2 Punkte)

**8. Gruppengeschwindigkeit eines Lochzustands**

Es sei in zwei Dimensionen im Zonenzentrum eines Halbleiters die Energie der Elektronen im Valenzband durch  $E_e(\vec{k}) = -\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2)$  gegeben (= Rotationsparaboloid). Zeigen Sie anhand einer „Fläche“ konstanter Energie in zwei Dimensionen (= Kreis in  $k_x$ - $k_y$ -Ebene), dass für die Gruppengeschwindigkeit  $\vec{v}_h(\vec{k}_h)$  eines Lochs einerseits  $\vec{v}_h(\vec{k}_h) = \vec{v}_e(\vec{k}_e)$  gilt und dennoch  $\vec{v}_h(\vec{k}_h)$  die gleiche Richtung hat wie  $\vec{k}_h$ . Daraus folgt zwangsläufig, dass für die Lochstromdichte eines Lochs gilt:  $\vec{j}_h = e\vec{v}_h(\vec{k}_h) = \frac{e\hbar}{m_h}\vec{k}_h$ .

Sei ein konstantes äußeres elektrisches Feld  $\vec{\mathcal{E}}_{el} = \mathcal{E}_{el}\vec{e}_x$  gegeben.

- (a) Zeigen Sie zunächst für  $\mathcal{E}_{el} = 0$  anhand einer Skizze, dass eine Elektronenfehlstelle bei  $\vec{k}_e$  im Valenzband äquivalent zu einem voll besetzten Valenzband plus einem einzelnen (positiv geladenen) Lochzustand bei  $\vec{k}_h = -\vec{k}_e$  ist. Es genügt dazu, die Zustände auf einem Kreis konstanter Energie mit Radius  $k_e$  zu betrachten.
- (b) Zeigen Sie nun für  $\mathcal{E}_{el} > 0$ , dass die Wirkung von  $\mathcal{E}_{el}$  auf das mit einer Elektronenfehlstelle bei  $\vec{k}_e$  versehene Valenzband einem positiven Strom in Richtung von  $\vec{\mathcal{E}}_{el} = \mathcal{E}_{el}\vec{e}_x$  entspricht, indem Sie die Verschiebung des Kreises konstanter Energie im elektrischen Feld unter Berücksichtigung von Teilaufgabe (a) betrachten.
- (c) Betrachten Sie nun wiederum eine Elektronenfehlstelle bei  $\vec{k}_e$  im Valenzband und zeichnen Sie dort die Gruppengeschwindigkeit  $\vec{v}_e(\vec{k}_e)$  ein. Nutzen Sie dazu den Zusammenhang zwischen  $\vec{v}_e$ ,  $E_e(\vec{k})$  und einem Kreis konstanter Energie. Machen Sie nun das Gleiche für den Lochzustand, indem Sie auch hier einen Kreis konstanter Energie definieren und berücksichtigen, dass der der Elektronenfehlstelle entsprechende Lochzustand sich in einem (Loch-)Leitungsband befindet [d.h.  $E_h(\vec{k}_h) > 0$ !].

Hinweis: Siehe Online-Übungsblatt mit Hinweisen.

(3 Punkte)